



# AVERTISSEMENTS AGRICOLES



## Nord Pas de Calais GRANDES CULTURES

BULLETIN N° 8 DU 19 MAI 1994

**BETTERAVE** : Intervenir sur pucerons pour parcelles non protégées.

**BLE D'HIVER** : Avancer la protection septoriose.

### BETTERAVES

► **STADE** : 2-4 feuilles vraies.

► **PUCERONS VECTEURS DE LA JAUNISSE** : Début d'installation en parcelles de pucerons vecteurs.

Les données du réseau de piégeage en bacs jaunes mettent en évidence l'arrivée de *Myzus persicae*, principal puceron vecteur.

POSTE	<i>Myzus persicae</i>	<i>Myzus ascalonicus</i>	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	<i>Acyrtosiphon pisum</i>	<i>Aphis fabae</i>
Lillers		4	4	1	
Vimy	1	1		10	
Sus St Léger				1	
Norrent Fontes		4		5	
Loos-en-Gohelle	7	1	5		5
Drincham			5	1	1 1
Escaudoeuvres		4			

Semaine du 11 au 16 mai (réseau SPV - ITB - Sucreries)

► **PRECONISATION** : Début de la protection foliaire avec insecticide dans le cas des parcelles non protégées GAUCHO, TEMIK ou DACAMOX.

► **ATOMAIRES** : Quelques piqûres çà et là sur parcelles non protégées (rare).

► **TIPULES - TAUPINS** : Petite présence locale (Flandre, Boulonnais...).

D.R.A.F. - Service Régional de la Protection des Végétaux

BP 47 - 62750 LOOS EN GOHELLE - ☎ 21.28.27.27 - Fax : 21.43.97.72

Abonnement : Régisseur des Recettes D.R.A.F. - BP 505 - 59022 LILLE CEDEX

## BLE D'HIVER

► **STADE** : 2-3 noeuds en variétés tardives HAVEN, RITMO, etc...

Dernière feuille étalée à gonflement en variétés précoces SIDERAL, SOISSONS.

Situation intermédiaire pour VIKING, APOLLO, FORBY, etc...

► **MALADIES** :

\* **Rouille jaune** : Quelques beaux foyers sur le littoral Mer du Nord (SLEJPNER, RITMO non protégés). Quelques symptômes çà et là en Flandre intérieure (RECITAL).

\* **Oïdium** : Hésite à s'installer, constamment lessivé par les pluies. Plus aucune gravité à redouter à partir de ce stade de la céréale.

\* **Septoriose** : Très fort risque en tous secteurs, suite aux pluies contaminatrices de fin avril et du mois de mai (données PRESEPT pour les semis d'octobre et novembre).

► **PUCERONS** : Tout début des installations en parcelles.

Vol faible enregistré au piège à suction de Loos-en-Gohelle :

. 2 *Sitobion avenae*

. 9 *Metopolophium dirhodum*.

► **PRECONISATION** : Suite à nos précédents bulletins, toutes les parcelles ont déjà reçu une protection septoriose visant :

. soit piétin - septoriose (semis précoces) traitement dès le 28 avril

. soit uniquement septoriose (semis novembre) traitement dès le 5 mai.

Le risque septoriose étant maximum, il faut intervenir en relai dès que possible.

En variétés précoces, la dernière feuille est déjà déployée, il n'y aura pas à réintervenir si le fongicide est utilisé à bonne dose.

En variétés tardives, la dernière feuille n'est pas sortie et le traitement déclenché vers le 20 mai devra être relayé 15 à 20 jours plus tard pour assurer la protection complète du feuillage.

Il faut néanmoins protéger dès maintenant, vu la gravité de l'épidémie, le premier fongicide appliqué en montaison est en fin de rémanence et du nouveau feuillage est apparu.

Ne pas oublier qu'en région Nord, si le printemps est humide, la septoriose est la maladie la plus préjudiciable au rendement.

Insecticide inutile pour le moment.

### AGRIMIEUX 1994

**Dimanche 26 Juin à Loos-en-Gohelle**

***Agriculture dynamique et environnement***

☛ Une journée pour les agriculteurs et leurs techniciens : plusieurs essais, sites de piégeages... (Grandes cultures, Légumes, Pommes de Terre...).

☛ Portes ouvertes de la Station Régionale du S.R.P.V. et de la Station d'Etudes sur la Lutte Biologique de la F.R.E.D.E.C.

☛ Une journée pour leurs familles et amis : élevage d'insectes, produits régionaux, découverte des terroirs...